Aurélie Quéméner - Isabelle Coll

Paramétrisation et calcul de flux de dépôt d'ozone sur les cultures avec CHIMERE

Programme ANR (2008)

Vulnérabilité : Milieux, Climat et Société

Modèles mis en œuvre et interactions

CHIMERE

Calcul du dépôt dans CHIMERE

Module de dépôt Wesely (1989) calcul de Ra, Rb et Rc

9 landuses (crops, grassland, bareground, water, urban, shrubs, needLeaf and broadLeaf Forest, ocean)

39 espèces (O3, SO2, NO2, NO, NH3, HCL, ...)

16 types de végétations (CF, DF, NF, BF, TemperateCrops, MediterC, Rootcrops, SNL, grassland, Mscrub, wetland, tundra, desert, water, ice, urban)

Calcul de Rc: Flag Yes /No

CHIMERE

- Gstomatique: *Emberson et al* (lai, fphen, gmax, flig)
- Gnon-stomatique (Gext(dsai), Rin, cte, .)

Equations d'Eric Lamaud:

- $G_{\text{stomatique}} = a \text{ GPP}^b$
- $G_{\text{non-stomatique}} = G_{\text{cuticulaire}} + G_{\text{sol}}$, condition sur RH

CHIMERE-SURFATM

- Schéma résistif de SURFATM
- $G_{\text{sto}}/G_{\text{nsto}}$ sont couplés
- G_{sto} : *Emberson et al.*

$V_{\text{depot}} = f(1/(\sum \text{Resistance}) , \text{type de végétation})$
et pondéré par la proportion de landuse

Wesely

Ra: Résistance aérodynamique

Rb: Résistance quasi-laminaire de la couche limite

Rc: Résistance du couvert

Rs: Résistance stomatique

Rns: Résistance non-stomatique

$$g_c = \frac{1}{R_c} = g_s + g_{ns}$$

CHIMERE Référence

$$g_s = g_{max} \times \left[\min(f_{phen} f_{O_3}) \right] \times f_{light} \\ * \max\{f_{min}, (f_{temp} \times f_{VPD} \times f_{SWP})\}$$

$$g_{ns} = SAI \times g_{ext} + \frac{1}{R_{ac} + R_{ig}}$$

CHIMERE Relation expérimentale

$$g_s = aGPP^b$$

$$g_{ns} = g_{soil} + g_{cut} = \frac{u^*}{R_{ac} + R_{ig}} + \frac{u^*}{R_{cut}}$$

Calcul du dépôt dans CHIMERE

Module de dépôt Wesely (1989) calcul de Ra, Rb et Rc

9 landuses (crops, grassland, bareground, water, urban, shrubs, needLeaf and broadLeaf Forest, ocean)

39 espèces (O3, SO2, NO2, NO, NH3, HCL, ...)

16 types de végétations (CF, DF, NF, BF, TemperateCrops, MediterC, Rootcrops, SNL, grassland, Mscrub, wetland, tundra, desert, water, ice, urban)

Calcul de Rc: Flag Yes /No

CHIMERE

- Gstomatique: *Emberson et al* (lai, fphen, gmax, flig)
- Gnon-stomatique (Gext(dsai), Rin, cte, .)

Equations d'Eric Lamaud:

- $G_{\text{stomatique}} = a \text{ GPP}^b$
- $G_{\text{non-stomatique}} = G_{\text{cuticulaire}} + G_{\text{sol}}$, condition sur RH

CHIMERE-SURFATM

- Schéma résistif de SURFATM
- $G_{\text{sto}}/G_{\text{nsto}}$ sont couplés
- G_{sto} : *Emberson et al.*

$V_{\text{depot}} = f(1/(\sum \text{Resistance}) , \text{type de végétation})$
et pondéré par la proportion de landuse

CHIMERE Surfatm

$$R_c = [R_{plant}^{-1} + R_{soil}^{-1}]^{-1}$$

$$R_{plant} = R_b * [R_s^{-1} + R_{cut}^{-1}]^{-1}$$

$$R_{soil} = R_{ac} + R_{ig} + R_{bs}$$

Représentation des Zones de Cultures CHIMERE

Chaque maille représente le % de culture repartit en 2 types :

- MC mediterranean crops (30%)
- TC temperate crops (70%)

Proportion de la surface de culture de chaque maille

Représentation des Zones de Cultures

ID	PIN	HET	VIDE	VIDE	MA	BL	OR	C3	PRAI	SHR	VIDE	VIDE	Snu	WA	Vide	Urb
0	100	100	0	0	10	20	8	62	100	100	0	0	100	100	0	100
1	100	100	0	0	20	18	5	48	100	100	0	0	100	100	0	100
2	100	100	0	0	4	43	11	42	100	100	0	0	100	100	0	100
3	100	100	0	0	7	20	6	67	100	100	0	0	100	100	0	100
4	100	100	0	0	2	3	5	90	100	100	0	0	100	100	0	100
5	100	100	0	0	0	5	8	87	100	100	0	0	100	100	0	100
6	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	100	100	0	100
7	100	100	0	0	1	5	9	89	100	100	0	0	100	100	0	100
8	100	100	0	0	6	34	13	41	100	100	0	0	100	100	0	100
9	100	100	0	0	15	11	6	68	100	100	0	0	100	100	0	100
10	100	100	0	0	2	31	25	42	100	100	0	0	100	100	0	100
11	100	100	0	0	1	1	1	97	100	100	0	0	100	100	0	100
12	100	100	0	0	0	3	9	88	100	100	0	0	100	100	0	100
13	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	100	100	0	100
14	100	100	0	0	2	37	7	54	100	100	0	0	100	100	0	100
15	100	100	0	0	0	6	2	92	100	100	0	0	100	100	0	100
16	100	100	0	0	15	18	7	60	100	100	0	0	100	100	0	100
17	100	100	0	0	13	23	9	53	100	100	0	0	100	100	0	100

N° département

% des 4 cultures

Pour ChimExp et ChimSurf:
Chaque maille est lié a un numéro de département
Chaque département a 4 types de cultures (blé, maïs, orge, autre C3)

Evolution du LAI au cours de l'année

ChimRef LAI

ChimExp/ChimSurf LAI

ChimRef Pheno LAI

Campagnes de calibration:

- Grignon (orge 2007, maïs 2008, blé 2009)
- Le Bray (pin 2008)
- Lusignan (prairie 2010)
- Nancy (hêtre 2010/2011)

Campagnes de validation:

- Grignon (maïs 2002, blé 2006)
- Le Bray (pin 2007)

Parameters	Definition/Name	Unit
GcO3	Ozone Canopy Conductance	cm/s
Tair	Temperature at 2m	°C
RH	Relative Humidity	%
U*	Friction velocity	m/s
GPP	Gross Primary Production	μmol/m ² .s
Rain	Pluviometry	Mm
LAI	Leaf Area Index	M
Rg	Solar radiation	W/m ²

Tableau 1 : Table of principal parameters mesured over sites

Periode	Site	Vegetation	Calibrat°/Validat°
2007 April-May	Grignon	Soybean	Calibration
2008 March-Dec.	Grignon	Maize	Calibration
2008 May-Aug.	Le Bray	Pine forest	Calibration
2009 March-Aug.	Grignon	Wheat	Calibration
2010 Sept - 2011 Mar.	Nancy	Beechwood	Calibration
2010 Aug.-Sept.	Lusignan	Grassland	Calibration
2002 Jun-Oct.	Grignon	Maize	Validation
2006 March-Aug.	Grignon	Wheat	Validation
2007 May-Aug.	Le Bray	Pine forest	Validation

Tableau 2 : Field data used for calibration and validation for experimental relation

Série Temporelle : Maïs 2002

Gcstom Corn 2002

Gcnst Corn 2002

Gc Corn 2002

Gs : cycle diurne avec un maximum en milieu de journée

Gns : variabilité temporelle

Gc: meilleure restitution la nuit pour l'expérimental

Série Temporelle : Blé 2006

Gcstom wheat 2006

Gcnst wheat 2006

Gc wheat 2006

Série Temporelle : PIN 2007

Gstom PIN 2007

Gc PIN 2007

Cartes de dépôt : comparaison sur 2006

01/01/2006 - 27/12/2006 ChimRef

01/01/2006 - 27/12/2006 ChimExp

01/01/2006 - 27/12/2006 ChimSurf

Série temporelle: O₃

Maille du site Grignon : période du 21 au 25 mai 2006

Merci !!!